

PÍ SOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

STODAL SIRUP

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, pretože obsahuje pre Vás dôležité informácie.

Tento liek je dostupný bez lekárskeho predpisu. Avšak aj tak musíte užívať STODAL sirup obozretne, aby sa dosiahli čo najlepšie výsledky.

- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.
- Ak sa príznaky Vášho ochorenia nezlepšia alebo ak sa zhoršia do 5 dní, musíte kontaktovať lekára.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:

1. Čo je STODAL sirup a na čo sa používa.
2. Skôr ako užíjete STODAL sirup.
3. Ako užívať STODAL sirup?
4. Možné vedľajšie účinky.
5. Ako uchovávať STODAL sirup?
6. Ďalšie informácie.

1. ČO JE STODAL sirup A NA ČO SA POUŽÍVA

FARMAKOTERAPEUTICKÁ SKUPINA

Homeopatikum

CHARAKTERISTIKA

Zložený homeopatický liek.

Farmakodynamické vlastnosti účinných látok zodpovedajú výsledkom patogenetických pokusov s liečivými látkami popísanými v Materia Medica Homeopatica.

TERAPEUTICKÁ INDIKÁCIA:

Stodal sirup pôsobí na liečbu kašľa rôzneho pôvodu.

2. SKÔR AKO UŽIJETE STODAL sirup

Neužívajte STODAL sirup

- keď ste alergický (precitlivený) na liečivá alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek lieku.
- ak trpíte zriedkavými dedičnými problémami ako sú intolerancia fruktózy, glukózo-galaktóza malabsorpcia alebo deficit sacharázy a izomaltázy.

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní STODAL sirupu

- Jedna dávka pre dospelých (1 polievková lyžica) obsahuje 11,25g sacharázy a 0,2g etanolu.

- Jedna dávka pre deti (1 kávová lyžička) obsahuje 3,75 g sacharózy a 0,065g etanolu.
- Škodlivý pre tých, ktorí trpia alkoholizmom. Musí sa vziať do úvahy udojčiacich a tehotných žien, detí a vysoko rizikových skupín, ako sú pacienti s poškodenou funkciou pečene alebo epilepsiou.
- Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

Užívanie iných liekov

STODAL sirup nemá vplyv na účinok iných súčasne užívaných liekov.

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekárske predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Užívanie STODAL sirupu s jedlom a nápojmi

Bez rizika.

Tehotenstvo a dojčenie

Doteraz nebol zistený žiadny vplyv na tehotné alebo dojčiace ženy.

Skôr ako začnete užívať akýkoľvek liek, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

STODAL sirup nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

3. AKO UŽÍVAŤ STODAL sirup

Vždy užívajte STODAL sirup presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Zvyčajná dávka je:

Deti (do 11 rokov) : 1 kávovú lyžičku 3 – 5 x denne.

Dospelí a mladiství (11 až 18 rokov) : 1 polievkovú lyžicu 3 – 5 x denne

Spôsob podania:

Perorálne užitie.

Ak užijete viac STODAL sirupu, ako máte

Bez rizika .

Ak zabudnete užiť STODAL sirup

Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať STODAL sirup

Bez rizika.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Nie sú známe.

Tak ako všetky lieky, aj STODAL sirup môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavujú u každého.

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak spozorujete vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

5. AKO UCHOVÁVAŤ STODAL sirup

Uchovávajújte mimo dosahu a dohľadu detí .

Uchovávajújte na suchom mieste pri teplote od 15°C do 25°C.

Chránite pred svetlom.

Nepoužívajte STODAL sirup po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatuli po skratke „EXP“.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo STODAL, sirup obsahuje

Liečivá: 100g sirupu obsahuje:

Pulsatilla (Poniklec lúčny) 6 CH.....	0,95 g
Antimonium tartaricum (Vinan antimonito draselný)6 CH.....	0,95 g
Rumex crispus (Štiav kučeravý)6 CH	0,95 g
Myocarde (Srdce)6 CH.....	0,95 g
Bryonia (Posed biely)3 CH.....	0,95 g
Coccus cacti (Červec nopálový)3 CH.....	0,95 g
Ipecacuanha (Uragoga pravá)3 CH	0,95 g
Spongia tosta (Hubka umývacia)3 CH	0,95 g
Sticta pulmonaria (Jamkatec pľúcny)3 CH.....	0,95 g
Drosera MT(Rosička okrúhlohlístá–materská tinktúra)..	0,95 g
Polygala sirup.....	19,00 g
Tolu sirup.....	19,00 g

Ďalšie zložky sú:

Pomocné látky: karamel (Saccharum tostum), jednoduchý sirup (sirupus simplex), etanol 96% (ethanolum 96%), kyselina benzoová (acidum benzoicum)

Ako vyzerá STODAL sirup a obsah balenia

STODAL je vo forme číreho, bezfarebného sirupu.

Obsah balenia: Liekovka z hnedého skla, polyetylénový šraubovací uzáver, papierová škatuľa, písomná informácia pre používateľov, 200 ml sirupu.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca

BOIRON
20, rue de la Libération
69 110 SAINTE FOY LES LYON
FRANCÚZSKO

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená vo februári 2009.